長期減毛･色素性疾患用レーザー装置 GentleMax Pro
脱毛治療を受けられる方へ

当院で使用する GentleMax Pro は、厚生労働省の医療機器承認を取得したロングパルスアレキサンドライト・ヤグレーザーです。アレキサンドライトレーザーとヤグレーザーの波長を使い分け、毛根のメラニン色素にレーザー光線を吸収させて、その熱で毛根周囲の組織にダメージを与え長期間における減毛（脱毛）を行うことができる治療方法です。毛には毛周期（毛が生えかわるサイクル）があり、脱毛ではその毛周期の成長期にある毛にレーザーを照射することで減毛（脱毛）の効果がみられます。部位によって治療の間隔は異なりますが、約 1 ヶ月半から 2 ヶ月毎に照射を繰り返していきます。平均で 5 回～10 回、年齢や部位によっては 10 回以上かかることもあり個人差があります。

治療が受けられない方・禁忌

下記の疾患や症状がある方は治療を受けられません。

□755nm もしくは 1064nm の波長域の光に過敏な、又は光過敏症の既往がある方
□単純ヘルペス 1 型又は 2 型の活動病変を有する方
□治療部位に悪性腫瘍がある方
□刺青・アートメイクがある皮膚上
□開放創や感染創のある皮膚
□2 ヶ月以内に強い日焼けをされている方
＊妊娠中の方は安全性が確立されていません。医師にご相談ください。

治療に注意が必要な方

下記の病気や症状がある、下記の薬剤を服用中の方は医師の判断によって治療が受けられない場合があります。

□全身状態不良の方
□てんかん発作の既往を有する方
□ケロイド・瘢痕体質の方
□糖尿病等の慢性疾患を有する方
□免疫抑制剤・ステロイド製剤・抗凝固剤・金製剤・鉄剤を内服中の方
□フィラー注入部位
□黒子の部位
□歯科材料、チタンプレート、ペースメーカー等の金属系インプラント材料を埋め込まれている方

（次項へ続く）

治療における注意事項と自己ケアについて

・毛抜きやワックスでの脱毛処理は行わず、シェーバーで剃毛処理を行ってください。
治療部位は前日に剃毛処理を行い来院してください。
・治療部位の日焼け止めや化粧品は、治療前に落としてください。
・脱毛後は、毛孔周囲に赤み（軽度の熱による炎症）がおこる場合もあります。
通常数時間～24 時間以内に赤み・ヒリヒリ感は消失します。その後小さな丘疹となり自然に治ります。炎症が引かず、痒みや熱傷等の症状を呈した時は来院してください。
・治療中、及び治療後 6 か月間は強い日焼けを避けるようにしてください。
・治療後は、保湿剤や日焼け止め（SPF30 以上）を使用して、スキンケアを行ってください。
・照射後 2 週間程度は毛が残存します。残存している毛は、毛根がダメージを受けているため自然と抜け落ちます。

副作用・合併症

・疼痛　・発赤　・浮腫/腫脹　・熱傷　・凍傷　・硬毛化　・痂皮形成　・水疱
・一過性の炎症性色素沈着　・色素脱失　・軽度の瘢痕形成

推奨治療間隔

・1 カ月半～ 2 カ月間隔
＊治療部位により異なります。